



# SAWS

SYMPTOMSTYRET ALKOHOL ABSTINENSBEHANDLING

SHORT ALCOHOL WITHDRAWAL SCALE

# SAWS

- HVAD ER FORMÅLET MED SAWS ?
- HVORDAN MÅLER VI PÅ EFFEKTEN AF SAWS ?
- HVORLEDES KAN SAWS BIDRAGE TIL EN HØJ EFFEKTIVITET I BEHANDLINGSTILBUDET?
  - SAWS TIL ALLE ?
- ER DER SITUATIONER HVOR SAWS IKKE ER TILSTRÆKKELIGT ELLER BRUGBART ?

# KINDLING EFFEKT

FORMÅLET MED SAWS ER, AT BESLUTNINGEN OM AT BLIVE ÆDRU BLIVER LETTERE.

SAWS FOREBYGGER DELIRIUM TREMENS OG ER MED TIL AT REDUCERE KINDLING, SÅLEDES AT FORVÆRRING AF ABSTINENSTILSTANDEN BREMSES.

UBEHANDLEDE ABSTINENSSYMPTOMER KAN FØRE TIL DELIRIUM TREMENS. DELIRIUM TREMENS ER LIVSTRUENDE MED DØDELIGHED PÅ OP TIL 20%, MENS SUFFICIENT BEHANDLEDE TILFÆLDE HAR EN DØDELIGHED PÅ CIRCA 1%.

DER KAN IKKE SÆTTES TID PÅ ALKOHOLENS SKADELIGE EFFEKT PÅ HJERNEN – MEDICIN OG SAWS KAN FLADE KURVEN UD.



# EFFEKT MÅLING OG SAWS

SAWS ER ET DIREKTE MÅLBART VÆRKTØJ SOM VI BRUGER I  
ALKOHOLBEHANDLINGEN.

EFFEKTEN MÅLES VED AT SCOREN FALDER I TAKT MED AT MEDICINEN  
VIRKER.



# EKSEMPEL 1

Startdato: 6/10/2020, Oprettet af: KG59. Præparat: Chlordiazepoxid 25 mg							
Dag	1	2	3	4	5	6	7
Promille	0	0	0				
Angst/Ængstelig	2	1	0				
Søvnforstyrrelser	1	0	0				
Hukommelsesbesvær	0	0	0				
Kvalme	0	0	0				
Indre uro	3	1	0				
Rysten	3	1	0				
Følelse af forvirrethed	0	0	0				
Sved	0	0	0				
Dårligt humør/Skidt tilpas	1	0	1				
Hjertebanken	0	0	0				
Sum	10	3	1				
Antal tabl	10	7	5				
Rest		1	0				
Bemærkning	---		---				



# BRUG AF SAWS TIL EFFEKTIV BEHANDLING

- DET, SOM ER AF STØRST VIGTIGHED FOR ET EFFEKTIVT OG VELLYKKET BEHANDLINGSFORLØB, ER AT DEN INDLEDENDE BEHANDLING ER SUFFICIENT.
- VI HAR ET FÆLLES MÅL, NEMLIG AT ABSTINENS SYMPTOMERNE FORSVINDER. DERUDOVER ER MÅLET I DET FØRSTE DØGN, AT BORGEREN FALDER TIL RO OG OPNÅR NATTESØVN. TIL SIDST KAN EN SUFFICIENT ABSTINENSBEHANDLING UNDERSTØTTE LYSTEN TIL AT BLIVE ÆDRU, LETTE OVERGANGEN TIL DEN AMBULANTE BEHANDLING OG FASTHOLDE BORGEREN I DEN VIDERE ALKOHOLBEHANDLING.

# KRITERIER FOR AT INDGÅ I SAWS

- SKØNNES AT KUNNE KOOPERERE TIL SELVSCORING
  - IKKE BENZODIAZEPIN AFHÆNGIG
  - MILDE TIL MODERATE ABSTINENSSYMPTOMER
- INGEN KRAMPER ELLER DELIRIUM TREMENS INDEN FOR DEN SIDSTE MÅNED
- HVIS BORGEREN HAR EN KENDT PSYKISK KOMORBIDITET ER DET EN KONTRAINDIKATION



## PSYKISK KOMORBIDITET?

SCOREN FORBLIVER DEN SAMME OG ER I DEN HØJE ENDE, EFTER FX 3 DAGE. DET KAN VÆRE AT BORGEREN FORTSAT SCORER HØJT PÅ ANGST OG INDRE URO. HER SKAL DET OVERVEJES OM BORGEREN KAN HAVE EN UKENDT PSYKISK KOMORBIDITET. BORGEREN OVERGÅR HER OFTE TIL INDIVIDUEL VURDERING DAGLIGT VED LÆGE OG SUNDHEDSPERSON.

HVIS BORGEREN HAR EN KENDT PSYKISK KOMORBIDITET, VIL DET VÆRE EN KONTRAINDIKATION OG BORGEREN INDGÅR I ENTEN I FAST NEDTRAPNING ELLER DAGLIG VURDERING.

# EKSEMPEL 2

Startdato: 21/9/2020, Oprettet af: CA02. Præparat: Chlordiazepoxid 25 mg

Dag	1	2	3	4	5	6
Promille	0	0				
Angst/Ængstelig	3	2	2	3		
Søvnforstyrrelser	3	2	0	0		
Hukommelsesbesvær	2	0	0	3		
Kvalme	2	0	0	2		
Indre uro	3	3	3	3		
Rysten	2	3	1	1		
Følelse af forvirrethed	0	2	2	3		
Sved	2	3	3	2		
Dårligt humør/Skidt tilpas	1	2	1	3		
Hjertebanken	2	0	0	2		
Sum	20	17	12	22		
Antal tabl	12	12	10			
Rest		0	0			
Bemærkning		***				

**TAK FOR NU**